

Recherche ANTICORPS anti PF4 et vaccination anti COVID19

Dans un contexte de suspicion de thrombose veineuse et/ou artérielle 4 à 28 jours après la vaccination anti COVID 19, la recherche d'Anticorps anti PF4 doit être sous-traitée à un laboratoire de référence pour être réalisée par TEST ELISA avec PVS/PF4 comme antigène et test d'activation sensibilisé.

Pour raisons logistiques, Le laboratoire de référence que nous avons choisi pour réaliser cet examen est le [laboratoire d'hématologie de l'APHP Nord- Hôpital Bichat](#).

Le bon de demande devra impérativement préciser le contexte de la demande « suspicion de thrombose veineuse et/ou artérielle après vaccination anti COVID 19 » et 2 tubes citratés d'hémostase (bleu clair) doivent être prélevés avant le début du traitement anticoagulant.

Les résultats vous seront transmis, comme pour tout examen sous traité, par le laboratoire du GHRE : site de St Malo.

Pour plus d'informations sur les conditions de prélèvement et de transport au laboratoire, vous pouvez consulter le manuel de prélèvement du laboratoire.


Merci également de vous adresser au laboratoire

Contacts Laboratoire :

Dr Valérie Coignard, Dr Julien Goustille, Biologistes Référents Secteur Hématologie

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une actualisation des propositions de prise en charge des SARS-CoV-2 Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT), rédigées conjointement par des experts issus de la Société Française Neuro-Vasculaire, de la Société Française de Médecine Vasculaire, du Groupe Français d'Etudes sur l'Hémostase et la Thrombose, du Groupe d'Intérêt en Hémostase Pér opératoire, de l'Association des Neuro-Anesthésistes Réanimateurs de Langue Française et de la Société Française de NeuroRadiologie.

Ce document est susceptible d'être actualisé.



Lien vers le document : [SARS-CoV-2 Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia, Prise en charge en urgence](#)